

## Attention, elle peut causer des brûlures!

La sève contient des toxines activées par les rayons ultraviolets. Le contact avec la sève combiné à l'exposition à la lumière peut causer des dermatites sévères (semblable à des brûlures) et douloureuses de 24h à 48h après le contact. L'inflammation peut durer de 3 à 5 jours et les cicatrices peuvent subsister 6 ans (Lavoie et al., 2013). Elle présente donc un **problème de santé publique**.

### Que faire en cas de contact avec la sève?

Nettoyez la surface avec de l'eau et du savon. Protégez la zone affectée du soleil en portant des vêtements longs durant un minimum de 48h. Contactez un médecin si des brûlures apparaissent!

### Protégez vous lors d'interventions!

- Couvrez toutes les parties de votre corps à l'aide d'habits non absorbants.
- Portez des gants montant jusqu'au coude, des lunettes de protection et des vêtements longs!
- Par la suite, enlevez vos vêtements en les retournant à l'envers et en évitant de toucher aux parties ayant pu être en contact avec de la sève.
- Lavez vos vêtements dans la laveuse.
- Bien laver tous vos instruments de travail une fois terminé pour éviter les contacts croisés ou la dispersion de graines.

Pour davantage d'information, veuillez  
contacter l'Organisme de bassin  
versant Matapédia-Restigouche.

Il nous fera plaisir de vous donner  
davantage d'informations à ce sujet!

418-756-6115 #7013

<http://www.matapediarestigouche.org/>



Centre intégré  
de santé  
et de services sociaux  
du Bas-Saint-Laurent

Québec



COLLECTIF RÉGIONAL  
DE DÉVELOPPEMENT  
DU BAS-SAINT-LAURENT



# ATTENTION!

## La Berce sphondyle (commune)

*Heracleum sphondylium*  
Meadow cow parsnip



MDDELCC

**Plante exotique envahissante!**

**Soyons à l'affût afin de limiter son  
expansion!**



## Qu'est-ce que la Berce sphondyle?

- La Berce sphondyle est une plante exotique envahissante. Elle colonise rapidement les milieux!
- Présente depuis presque 80 ans dans la région, envahissante depuis tout récemment! Nous serions le seul cas au monde d'une invasion par cette espèce de berce<sup>1</sup>.
- Elle prend la place des espèces indigènes et occasionne une perte de biodiversité.
- Elle est très bien implantée dans la vallée de La Matapédia et l'éradication est difficilement envisageable. La stratégie raisonnable serait de la retirer des endroits critiques (parc, sentier etc.).

Mai - Juin



Juillet



Septembre



(OBVMR et Ville d'Amqui)

1-comm. pers. Claude Lavoie, 2017

## Ne la confondez pas!

Elle ressemble beaucoup à la Berce laineuse (présente sur le territoire) et du Caucase, voici quelques caractéristiques pour les identifier.

### Berce sphondyle

*Exotique envahissante*

- 5 à 7 folioles
- Poils sur les deux côtés de la feuille

(OBVMR)



### Berce laineuse

*Indigène*

- 3 à 5 folioles
- Poils sur la face inférieure seulement de la feuille

(OBVMR)

### Berce du Caucase

*Exotique envahissante*

- 1 à 3 folioles
- Absence de poils sur les deux côtés de la feuille



(Serge Rhéaume, MTMDET)

## Comment en disposer ?


- **Pour les plants : SI PAS DE FLEUR, NI DE GRAINES FORMÉES**: laissez-les sécher sur votre terrain. Une fois bien sec, vous pouvez en disposer dans le compost (bac brun).
- **Pour la fleur et les graines**: ensachez-les dans un sac de poubelle de bonne qualité et disposez-en aux poubelles. **Attention**, ne semez pas d'autres plants !

## Méthode de lutte\*

Il est important d'agir afin de limiter son expansion pour des raisons de santé publique et de protection de la biodiversité!

- 1 Assurez vous d'avoir correctement identifié la plante!
- 2 Protégez vous adéquatement afin d'éviter tout contact avec la sève.
- 3 Passez à l'**action!**  
À réaliser avant la formation de graines!

- **Pour quelques plants : Extraction manuelle**  
coupez les racines à 20 cm sous la surface du sol à l'aide d'une pelle et retirez le plant. Efficace contre la Berce du Caucase !



(Martine St-Amand)

- **Pour une plus grande densité :**
  - 1) Coupez la berce au ras du sol, 2) Posez un carton épais / géotextile / plastique noir sur le sol, 3) Laissez ainsi pendant 2 mois, 4) Ajoutez une bonne couche de terre et semez avec des espèces indigènes à croissance rapide.
  - Si vous **tondez déjà** votre terrain : tondez-le régulièrement afin d'empêcher la formation d'une fleur. *La tonte ne tue pas la berce et complique son identification.*
  - **Coupe d'ombelle** : Coupez toutes les tiges menant à la fleur.



(MDDELCC)

\*Comme la Berce sphondyle est très peu connue, l'OBVMR est en exploration des techniques de lutttes efficaces. Ainsi, l'efficacité des techniques n'est pas connue, mais nous nous devons d'agir !